Ficha Técnica

COLT PRIME®

1-Nome Comercial: COLT PRIME®

2-Composição:
Indoxacarb..... 0,06% (p/p)
Inertes..... 99,4% (p/p)

3-Fórmula Molecular:
$C_{22}H_{17}ClF_3N_3O_7$

4-Formulação
Gel

5-Apresentação:
Seringa 30g

6-Toxicologia:
DL50 oral aguda para ratos.....>2.000 mg/Kg;
DL50 dermal aguda para ratos.....>2.000 mg/Kg;
Classificação toxicológica: Indoxacarb - Classe I

7-Mecanismo de ação:
COLT PRIME - O Indoxacarb age através do bloqueio dos canais de sódio no inseto e no sistema nervoso.

8-Indicações de Uso:
COLT PRIME - É indicado para o controle de baratas (*Blatella germanica e Periplaneta americana*). Pode ser utilizado em indústrias, comércios, casas e hospitais.

9-Modo de usar:
COLT PRIME - Retire a tampa da seringa e pressione o êmbolo, colocando pequenos pontos de gel nos locais próximos onde as baratas transitam e abrigam. Aplique em frestas, rachaduras, cantos de paredes.

Dosagem:

1,0g/m² - *Periplaneta americana*

0,05g/m² - *Blatella germanica*

- **ATRATIVO**
- **EFICAZ**
- **ALTA ESTABILIDADE**
- **PRÁTICO**
- **ECONÔMICO**
- **RESIDUAL**

10- PRECAUÇÕES: CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS, CUIDADO! PERIGOSA SUA INGESTÃO, INALAÇÃO OU ABSORÇÃO PELA PELE.

- Não aplicar sobre alimentos e utensílios de cozinha, plantas e aquários.
- Não fumar ou comer durante a aplicação.
- Só utilizar em lugar de difícil acesso a crianças e animais domésticos.
- Usar equipamento de proteção individual (EPI) como roupa protetora, luvas, protetor ocular e respiratório.
- Manter o produto na embalagem original.
- Não reutilizar as embalagens vazias.
- Não é necessário desocupar a área.

11- Sinais e Sintomas de Intoxicação:
Pode causar irritação da pele, olhos e trato respiratório.

12 - Armazenagem:
Armazenar o produto em local adequado e longe da fonte de calor.

13- Vazamento Acidental
Absorver o produto com material inerte tal como: papel toalha, terra, areia, caulim e pano. Isolar e sinalizar a área, utilizar EPI's.

14- Eliminação e Descarte:
As sobras e resíduos do produto devem ser descartadas conforme a legislação municipal e/ou estadual. As embalagens vazias devem ser descartadas em um posto credenciado pelo fabricante.
Para maiores informações, acesse o site da ABAS: www.as.org.br/embalagem.htm

15-Primeiros Socorros:

- INGESTÃO: No caso de ingestão não provoque vômito, procure o médico levando a embalagem ou rótulo do produto;
- OLHOS: No caso de contato com os olhos, lave-os com água em abundância e procure o médico levando a embalagem ou rótulo do produto;
- PELE: No caso de contato com a pele, lave-a com água e sabão em abundância e procure o médico levando a embalagem ou rótulo do produto;
- INALAÇÃO: No caso de inalação do produto procure local arejado e vá ao médico levando a embalagem ou rótulo do produto. Se inalado em excesso remover a pessoa para local ventilado. Em caso de intoxicação, procurar o Centro de Intoxicações ou o Serviço de Saúde, levando a embalagem ou o rótulo do produto.

16-Indicações para uso médico:

Grupo Químico: Oxadiazina
Nome Comum: Indoxacarb
Antídoto/Tratamento: Anti-histaminico / Tratamento Sintomático
Telefone de Emergência 24 hs: 0800 014 11 49

Registro no M.S 3.0425.0156.001-9

Fabricado por:
Rogama Indústria e Comércio LTDA
Av. Alexandrina das Chagas Moreira, Nº 964
CEP: 12412-800 - Distrito Industrial, Pindamonhangaba – SP
CNPJ: 90.821.554/0001-42
Indústria Brasileira
Site: www.rogama.com.br
e-mail: rogama@rogama.com.br
SAC: (12) 3644-3030
sac@rogama.com.br

ROGAMA

CERTIFICADA
NBR ISO 9001:2008

Mais que produto. Suporte e garantia.