

1. Características Técnicas

Raticida anticoagulante pó de contato de dose múltipla e repelente à água. À base de Cumatetrail 0,75%, Grupo Químico das Cumarinas. Resistente por mais tempo em condições de alta umidade.

2. Indicação

Indicado para controle de camundongos (*mus musculus*), ratos (*rattus rattus*) e ratazanas (*R. Novergicus*) em áreas urbanas e rurais.

3. Modo de usar

Procure os caminhos freqüentados pelos roedores, evitando alterar a disposição dos objetos na área tratada, pois, se os roedores notarem qualquer alteração no trajeto habitual, poderão alterar as trilhas e caminhos utilizados. Preferencialmente aplique nos locais onde são encontrados sinais dos roedores como tocas, buracos, esconderijos, trilhas, etc. O produto irá aderir às patas e ao corpo do roedor e a ingestão estará assegurada, pois os roedores têm o hábito de se lamberem para limpar os pêlos.

Aplique uma camada com cerca de 8 cm de largura sobre as superfícies freqüentadas pelos roedores. Nas tocas e esconderijos a aplicação deve ser feita, quando possível, com auxílio de uma polvilhadeira. Renovar sempre que necessário.

4. Restrições e Advertências :

“CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS”.

“Mantenha o produto na embalagem original e não reutilize a embalagem vazia”.

“Não aplique sobre alimentos e utensílios de cozinha, plantas e aquários”.

“Não fume, beba, nem coma durante a aplicação”.

“Contato perigoso a seres humanos e animais domésticos durante a aplicação”.

“Em caso de contato direto com este produto, lave a parte atingida com água fria corrente e sabão”.

“Em caso de contato com os olhos, lave-os imediatamente com água corrente em abundância”.

“Em caso de intoxicação, procure o Centro de Intoxicações ou Serviço de Saúde, levando a embalagem ou o rótulo do produto”.

“Não coloque este produto em utensílio de uso alimentar”.

“Só utilize em lugar de difícil acesso a crianças e animais”.

“O saco plástico deve ser inutilizado e colocado em fosso para lixo tóxico, ou enviado para reciclagem se houver, na região, um programa específico para este caso”.

“O método de desativação do produto é a incineração”.

“No caso de embalagens do tipo caixa de papelão, podem ser descartadas como lixo comum, uma vez que não existe contato do produto com essa embalagem”.

5. MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS :

Em geral : Em caso de indisposição remova a pessoa afetada do local do perigo para um local bem ventilado, protegendo-o contra resfriamento. **NO CASO DE SUSPEITA DE ENVENENAMENTO :** Chame imediatamente um médico.

Após contato do produto com os Olhos : Enxágüe os olhos com água limpa por vários minutos.

Após Ingestão : Administre, repetidamente, carvão medicinal em uma grande quantidade de água.

NOTA: Nunca de nada pela boca a uma pessoa inconsciente como também não nduza ao vômito.

Após contato do produto com a Pele : Remover as roupas contaminadas e lave completamente as partes afetadas do corpo com água e sabão.

6. Instruções Médicas

Grupo Químico: CUMARINA

Nome Comum: CUMATETRALIL

Ação Tóxica: Fragilidade capilar e hemorragias (acúmulo do efeito)

Antídoto : Vitamina K1 (phytomenadione). **CUIDADO:** Nem Vitamina K3 (menadione) nem Vitamina K4 (menadiol) são úteis como antídotos.

Geral : EM CASO DE CONTAMINAÇÃO ACIDENTAL: Lave cuidadosamente o corpo com água e sabão. Determinação do tempo de coagulação do sangue (i.e. método rápido). A determinação do tempo de coagulação do sangue é essencial (i.e. determinação de tempo da protrombina, método rápido). Para restaurar a coagulação administre vitamina K1 (oral ou venosa) Dosagem inicial: crianças acima de 12 anos e adultos: 15 – 25 mg. Crianças abaixo de 12 anos: 5 -10 mg. Tratamento adicional é necessário. Acompanhamento a longo prazo do protrombina é essencial.

Experiências Específicas ao Homem : Sangramento pelo nariz e gengiva.

Telefone de Emergência: 0xx 14 3417-6076

Telefone do Centro de Informações Toxicológicas: 0800-14-8110 (CEATOX)

7. Composição

Cumatetralyl 0,75%

Excipientes q.s.p. 100%

8. Registro: 3.2699.0003.001-8

9. Apresentação

Frasco Aplicador de 1 kg, caixa de embarque com 6 quilos.

10. Prazo de Validade : 2 (dois) anos a partir da data de fabricação

Observação

Antes de usar leia com atenção as instruções do rótulo.